

Regelmäßig anzutreffende Vogelarten in Berlin/Gatow und Umgebung

Vögel an unseren Gewässern/Teil 2 (verschiedene Arten)



Kormoran
Phalacrocorax carbo

(Familie Kormorane)

Körpergröße:
ca. 75-90 cm

Nahrung:
Fische, die tauchend erbeutet werden.

Sonstiges:
♂ und ♀ gleich gefärbt; Da Kormorane ihre Federn nicht wie Enten mit einer Bürzeldrüse einfetten können, müssen sie nach der Jagd ihr Gefieder trocknen.



Sonstiges:

Brüten bei uns in Kolonien auf Bäumen (z.B. auf der Insel Imchen und auf der Pfaueninsel) Auch vergesellschaftet mit Graureihern




Blessralle (Blesshuhn)
Fulica atra

(Familie Rallen)

Körpergröße:
ca. 40 cm

Nahrung:
Wasserpflanzen und kleinere Wassertiere (z.B. Schnecken, Muscheln, Krebstiere, Fische usw.)

Sonstiges:
♂ und ♀ ähnlich gefärbt, beim ♂ ist die weiße Stirnplatte ("Blesse") größer; Nest meist im Schilfgürtel, teilweise auch auf Booten.




Haubentaucher
Podiceps cristatus

(Familie Lappentaucher)

Körpergröße:
ca. 50 cm

Nahrung:
Kleine Fische, die tauchend erjagt werden.

Sonstiges:
♂ und ♀ ähnlich gefärbt, im Schlichtkleid unauffälliger; Nest meist schwimmend im Schilfgürtel.




Graureiher
Ardea cinerea

(Familie Reiher)

Körpergröße:
ca. 95 cm

Nahrung:
Vor Allem Fische und Lurche die im Wasser wadend erbeutet werden. Auch Insekten und Mäuse

Sonstiges:
♂ und ♀ beinahe gleich, im Flug mit typischen angewinkeltem Hals; Nester auf Bäumen, meist in Kolonien (z.B. Insel Imchen).



Verschiedene

Wer aufmerksam an unseren Gewässern entlang läuft, wird noch einige andere Arten entdecken: Zum Beispiel die heimische **Teichralle** *Gallinula chloropus*, (oben links), den, im Schilfgürtel brütenden **Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus* (oben rechts) oder auch die eigentlich aus Nordamerika stammende **Kanadagans** *Branta canadensis* (unten, neben einer Graugans).